

*¡Confianza
que da salud!*

Bacigermina

ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII



**Perfecta
para niños**



**No interfiere con otros
tratamientos, incluyendo
antibióticos**



**¡Sin sabor,
sin olor, sin color!**



Bacigermina

ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

BACIGERMINA

2. COMPONENTES:

2,000 millones de esporas de Bacillus Clausii, Pallets de hidróxido de sodio, EDTA disódico, Polisorbato 80, Propilenglicol, Agua purificada.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

4. DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas :

Terapia para ayudar a la recuperación de la flora microbiana intestinal, alterada durante el curso del tratamiento con antibióticos o agentes quimioterapéuticos. Trastornos gastrointestinales agudos y crónicos en lactantes, atribuibles a intoxicación o dismicrobismo intestinal y disvitaminosis.

4.2 Dosificación y método de administración:

Adultos: 2-3 ampollas al día; niños: 1-2 ampollas al día; lactantes: 1-2 ampollas al día. Administrar a intervalos regulares (3-4 horas), tomando el contenido de las ampollas tal cual o diluyéndolo en agua u otras bebidas por ejemplo, leche, té, zumo de naranja). Este medicamento es sólo para uso ORAL NO se debe inyectar ni administrar de ninguna otra forma.

4.3 Contradicciones :

Hipersensibilidad a los componentes o a otras sustancias estrechamente relacionadas.

4.4 Advertencias y precauciones de uso

La posible presencia de corpúsculos visibles en las ampollas de Bacigermina se debe a agregados de esporas de Bacillus Clausii y no indica, por tanto, que el producto haya sufrido ninguna modificación. Agitar el frasco antes de utilizarlo. Este medicamento es sólo para uso oral. No se debe inyectar ni administrar de ninguna otra forma. El uso incorrecto del medicamento ha provocado reacciones anafilácticas graves como el shock anafiláctico.

Precauciones:

Durante la terapia con antibióticos, el producto debe administrarse en el intervalo entre una dosis de antibiótico y la siguiente.

4.5 Interacción con otros medicamentos

No se conocen interacciones medicamentosas posteriores a la administración concomitante de otros fármacos.

4.6 Embarazo y lactancia:

No existen contraindicaciones para el uso del producto durante el embarazo y la lactancia.

4.7 Efectos indeseables

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Desconocido: reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupción, urticaria y angioedema. Infecciones e infestaciones: Frecuencia desconocida: bacteriemia (en pacientes inmunocomprometidos).

4.8 Sobredosis

Hasta el momento no se han notificado manifestaciones clínicas de sobredosis.

**¡Confianza
que da salud!**

